

**Министерство образования и науки РФ  
Совет ректоров вузов Томской области  
Открытая региональная межвузовская олимпиада  
2015-2016**

**ФИЗИКА**

**9 класс**

**I этап**

1. Необходимо для робототехники изготовить плоскую деталь размерами ( $l \times d \times h$ )  $6 \times 6 \times 0,5$  см на 3D-принтере. Сколько времени будет затрачено на такую печать детали, если технические характеристики принтера следующие. Толщина нити для печати одного слоя  $D = 0,2$  мм, скорость печати  $v = 100$  мм/с.

**Оценка задания № 1 – 10 баллов**

2. Студент Ягнышев Павел при проведении исследования температур плавления различных металлов повредил термопару, выдерживающую очень высокие температуры. Но придумал способ измерить температуру муфельной печи, где плавится металл, калориметрическим способом. Для этого он внес стальной шарик массой  $m_{\text{ст}} = 20$  г в печь, а после нагрева перенес в алюминиевый калориметр массой  $m_{\text{ал}} = 60$  г, содержащий  $m_{\text{в}} = 200$  г воды при температуре  $t_2 = 18^\circ\text{C}$ . Температура в калориметре установилась  $t_{\text{см}} = 26^\circ\text{C}$ . Помогите Павлу определить температуру  $t_1$  печи. Удельная теплоемкость стали  $c_{\text{ст}} = 0,46$  кДж/(кг ·  $^\circ\text{C}$ ), удельная теплоемкость алюминия  $c_{\text{ал}} = 0,92$  кДж/(кг ·  $^\circ\text{C}$ ), удельная теплоемкость воды  $c_{\text{в}} = 4,2$  кДж/(кг ·  $^\circ\text{C}$ ).

**Оценка задания № 2 – 10 баллов**

3. В прямоугольный сосуд с водой с площадью основания  $S$ , погрузили кусок льда, в который вморожена свинцовая дробинка объемом  $v$ . Как и на сколько, изменится уровень воды в сосуде после таяния льда? Плотность льда равна  $\rho_1$ , свинца -  $\rho_2$ , а воды -  $\rho_0$  соответственно.

**Оценка задания № 3 – 10 баллов**

4. Студент Алексей Тучак для нахождения ускорения свободного падения придумал установку, состоящую из двух небольших шариков, связанных нитью, перекинутой через стержень, укрепленного в штативе. Оба шарика висят над электропроигрывателем на разных высотах так, что всегда оказываются на одном радиусе диска проигрывателя, врачающегося с частотой  $v = 78$  об/мин. Один шарик находится на высоте  $h_1 = 25$  см, а второй – на высоте  $h_2 = 10$  см над диском. Определите ускорение свободного падения  $g$ , если после пережигания нити следы от упавших шариков на диске оказались разошедшимися на угол  $\varphi = 38^\circ$ .

**Оценка задания № 4 – 20 баллов**

**Желаем успеха!**